

გამოცემის სტრუქტურა: Issued by org. units. ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია Energo-pro Georgia Generation			
გამოცემის თარიღი: Date of Issue: 27.08. 2019.	მაღაში შესვლის თარიღი: Valid since: 28.08.2019.	მოქმედების ვადა: უვადო Valid till: Unlimited	
შეცვლილი დოკუმენტი: Replaced Document:			
დოკუმენტის ტიპი: Type of Document: ინსტრუქცია Instruction			
რეგისტრაციისა და დოკუმენტის ნომერი: Registration and file No.: INS13-2019			
სათაური: სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციაში“ მომხდარი უზედური შემთხვევებისას პირველადი დახმარების ჩატარების ინსტრუქცია			
Title: Instruction of first aid at accidents taken place in enterprises in JSC "Energo-Pro Georgia" hydro power plants			
შემდგენელი: Elaborated by: ალიკა ჭაფანძე Aliko Tchapandze	ანალიზის, რისკების შეფასების, ნორმატიული დოკუმენტაციის წარმოების განყოფილების სპეციალისტი Specialist of Analysis, risk assessment, normative documentation processing division	თარიღი: Date: 22.08.2019	ხელმოწერა: Signature: 
თავდები: Guarantor: ლევან საჩალელი Levan Sachaleli	ჰიდროელექტროსადგურების ექსპლუატაციის, დიაგნოსტიკის და ტექნიკური დეპარტამენტის უფროსი Head of Department Exploitation, Diagnostic, And Maintenance of Hydroelectric Power plants	თარიღი: Date: 22.08.2019	ხელმოწერა: Signature: 
ზედამხედველი: Taskmaster: დიან დიმოვი Dian Dimov	გენერალური დირექტორის მოადგილე Deputy General Director	თარიღი: Date: 22.08.2019	ხელმოწერა: Signature: 
დამტკიცებულია: Approved by: მიხეილ ბოცვაძე Mikheil Botsvadze	გენერალური დირექტორი General Director	თარიღი: Date: 27.08.2019	ხელმოწერა: Signature: 

1. შესავალი დებულებები

1. შესავალი დებულებები

1.1. მიზანი

წინამდებარე ინსტრუქციის მიზანს წარმოადგენს სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციაში“ მომხდარი უბედური შემთხვევებისას პირველადი დახმარების ჩატარება.

1.2. დოკუმენტებთან კავშირი

წინამდებარე ინსტრუქცია შესაბამისობაშია კომპანიის წესდებასთან, საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასთან.

1.3. მოქმედების სფეროს განსაზღვრა

ინსტრუქცია სავალდებულოა კომპანიის ელექტროტექნიკური პერსონალისთვის.

2. ტერმინთა განმარტება

3. პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა

3.1. დახმარების გაწევის უნივერსალური სქემა


ყურადღება!

მოცემული სქემა წარმოადგენს უნივერსალურს, პირველადი დახმარების გაწევის მიზნით მომხდარი ყველა შემთხვევისათვის.

როგორი უბედური შემთხვევაც არ უნდა მოხდეს — ავტოსაგზაო შემთხვევა, სიმაღლიდან ჩამოვარდნა, ელექტრული დენით დაზიანება ან წყალში ჩაძირვა (დახრჩობა) — ნებისმიერ შემთხვევაში პირველადი დახმარების გაწევის დაწყება საჭიროა გულის მოქმედების და სუნთქვის აღდგენით, შემდეგ უნდა გადაწყდეს სისხლდენის დროებით შეჩერების საკითხი.



მხოლოდ ამ ამოცანების გადაჭრის შემდეგ შეიძლება სახვევისა და არტაშანის დადება.


სწორედ ასეთი მოქმედების სქემა დაეხმარება შეუნარჩუნდეს სიცოცხლე დაზარალებულს სამედიცინო პერსონალის მოსვლამდე.



3.2. უეცარი სიკვდილი თუ არ არის გონიერება და არ ესინჯვება პულსი საძილე არტერიაზე

1		2	
დარწმუნდით რომ საძილე არტერიაზე პულსი არ ესინჯვება		განთავისუფლდეს გულმკერდი ტანსაცმლისაგან და შეეხსნას ქამარი	
დაუშვებელია!	დროის დაკარგვა სუნთქვის ნიშნების განსაზღვრის მიზნით	დაუშვებელია!	გულმკერდზე დარტყმა და გულის არაპირდაპირი მასაჟის ჩატარება, გულმკერდის ტანსაცმლისაგან განთავისუფლებისა და წელზე ქამრის შეუხსნელად
3		4	
დაიფაროს ორი თითით მახვილისებრი მორჩი		განხორციელდეს გულმკერდზე მუშტის დარტყმა	
დაუშვებელია!	დარტყმის განხორციელება მახვილისებრ	დაუშვებელია!	გულმკერდზე მუშტის დარტყმა საძილე არტერიაზე

მორჩზე ან ლავიწის არეში		პულსის არსებობისას	
5 დაიწყოს გულის არაპირდაპირი მასაჟი		6 განხორციელდეს ხელოვნური სუნთქვის „ჩაბერვა”	
გულმკერდის ჩაზნექვის სიღრმე უნდა იყოს არანაკლებ 3-4 სმ.		დაზარალებულს მოეჭიროს ცხვირზე, დაეკავოს ნიკაპი, გადაეწიოს თავი და გაუკეთდეს მაქსიმალური ჩაბერვა პირში.	
დაუშვებელია! ხელისგულის განთავსება გულმკერდზე ისე, რომ ცერა თითო მიმართული იყოს მაშველისკენ		დაუშვებელია! ხელოვნური სუნთქვის „ჩაბერვა” გაკეთდეს, წინასწარ ცხვირზე ხელის მოჭერის გარეშე	
7  ჩატარდეს რეანიმაციის კომპლექსი		ჩატარების წესები <ul style="list-style-type: none">თუ დახმარებას უწევს ერთი მაშველი, მაშინ ყოველი 30 დაწოლის შემდეგ უნდა განხორციელდეს 2 „ჩაბერვა”; (ევროპული ახალი სტანდარტით, საჭიროა წუთში 100-120 ზეწოლის განხორციელება გულმკერდზე)სიხლის გულთან სწრაფი დაბრუნებისათვის — აეწიოს ფეხები დაზარალებულს;თავის ტვინის სიცოცხლის უნარიანობის შენარჩუნებისათვის — დაზარალებულს თავზე დაედოს ცივი საფენი;კუჭიდან ჰაერის გამოსადევნად — გადააბრუნეთ დაზარალებული მუცელზე და დააწეუქით მუშტით ჭიპის	
თუ გუგები შევიწროვებულია მაგრამ გულისცემა არ არის, რეანიმაცია საჭიროა გაგრძელდეს სამედიცინო პერსონალის მოსვლამდე			
8 ორგანიზება გაუკეთდეს პარტნიორების მოქმედებას		პირველი მაშველი - ატარებს გულის არაპირდაპირ მასაჟს, იძლევა ბრძანებას „ჩაბერვა!” და აკონტროლებს გულმკერდის ამოწევის მიხედვით	



დაუშვებელია!

მაშველების ერთმანეთის პირისპირ
განთავსება და პარტნიორის უკნიდან
შემოვლა

ჩაბერვის ეფექტურობას.

მეორე მაშველი - ატარებს ხელოვნურ სუნთქვას, აკონტროლებს გუგების რეაქციას, სამიღე
არტერიაზე პულსს და პარტნიორებს აგებინებს
დაზარალებულის მდგომარეობას: „არის გუგების
რეაქცია! არ არის პულსი! არის პულსი! და ა.შ.”




მესამე მაშველი - გულზე სისხლის უკეთ
მიწოდებისათვის დაზარალებულს უწევს ფეხებს
მაღლა და ემზადება პარტნიორის შესაცვლელად,
რომელიც ატარებს გულის არაპირდაპირ შასაყსს.

რეანიმაციის თავისებურებანი შეზღუდულ გარემოში



1	განხორციელდეს გულმკერდზე მუშტის დარტყმა	2	დაწვინეთ დაზარალებული ზურგზე
დარტყმა შეიძლება განხორციელდეს დაზარალებულის „მჯდომარე” და „მწოლიარე” მდგომარეობაში.		რეანიმაციის კომპლექსი შეიძლება ჩაუტარდეს მხოლოდ ზურგზე მწოლიარე დაზარალებულს, სწორ და მყარ ზედაპირზე.	

3.3. კომატოზური მდგომარეობა როცა დაზარალებული არ არის გონიზე, მაგრამ სამიღე
არტერიაზე ესინჯება პულსი

1	დაწვინეთ დაზარალებული მუცელზე	2	მოაცილეთ ლორწო და მუცლიდან ამონაღები
---	----------------------------------	---	---

		ხელსახოცით ან სპეციალური რეზინის ბალონით პერიოდულად გასუფთავდეს პირის ღრუ ლორწოსაგან და ამონალებისაგან
ექიმების მოსვლამდე დაზარალებული საჭიროა მოთავსდეს მხოლოდ „მუცელზე მწოლიარე“ მდგომარეობაში		3 დაედოს თავზე ცივი
დაუშვებელია! კომაში მყოფი ადამიანის დატოვება ზურგზე მწოლიარე მდგომარეობაში		შეიძლება გამოიყენოთ ბოთლი ყინულით, ცივი წყლით, თოვლით, ან ჰიპოთერმიული პაკეტი

3.4. არტერიული სისხლდენა არტერიული სისხლდენის დროს

1	მიაჭირეთ თითები ან მუშტი არტერიას მითითებულ წერტილებში			
	მსხვილ სისხლგამტარ ძარღვებზე დაგერის ადგილები		საძილე არტერიის მიჭერა ჭრილობაზე ან ჭრილობის ქვემოთ	ხელისგულის ჭრილობიდან არტერიული სისხლდენის დროებითი შეჩერება
ლახტის დადებამდე დაზიანებული კიდური უნდა დავტოვოთ აწეულ მდგომარეობაში		მხრის არტერიაზე მიჭერა ჭრილობის ზევით		თემოს არტერიის მუშტით მიჭყლება
კიდურებზე, არტერიაზე მიჭერის ადგილი უნდა იყოს სისხლდენის ადგილის ზემოთ. კისერზე და თავზე – ჭრილობის ქვევით ან ჭრილობაზე		დაუშვებელია! დროის დაკარგვა კიდურების ტანსაცმლისაგან განთავისუფლებაზე		



შეცარცებულ
კვების და
შეიცვის შემთხვევაში
მაღალადუღი
ძაღლი



არააქტუ
ლური



მიკვირის თითი
დახტის პირველ
ხელის და
შემიწმებელ პერვის
არასებობის
ნაკლები მაღლი



დახტის
მართვის
ხელი

დახტის
მართვის
ხელი

ნაკლები მაღლი

კუცრაზე დახტებ
ადგენ პერვის
კონტროლის გარეშე

დაღების დროს

საჭიროა
სასრაული
დაღლის დასტი

ქრისტენის
სერმეტის აღმისამართის
იყენებენ ხელისაღურ
ხახვებს

საღმის დასტი


„კოდეტების“ ან
„მრავალურიან
ნაკლები დაღლანების
მაღლი“



არააქტუ
ლური



პირდაპირის
აღმარი
საბირი (დოკუმენტი)
მუხლებისა დოკუმენტი
აუსას კონტაქტი



ნამარ
მარტენ
შემიტანებე
ლახტი
არაშემი



დაღისმის მარტენი
და დამბგრძელ
ლახტის
თავისუფები
ბოლოს ქვეშ

ნარკეტის ქვეშ
სიკეთი წერილი
ლახტის დაგების
გრძის შითოვებით

პირდაპირის ლახტის დაღება შეიძლება
არაუმიტმს 1 საათისა



3.5. ჭრილობები კიდურებზე როგორ უნდა დაედოს ჭრილობას სახვევი

1	დაიფაროს	2	გადაეხვეს
	ჭრილობა სუფთა საფენით ისე, რომ ჭრილობის კიდეები არ გამოჩნდეს		საფენი დოლბანდით ან დამაგრდეს ლეიკოპლასტირით






	<p>აკრძალულია!</p> <p>ჭრილობის წყლით გაბანა</p>	<p>აკრძალულია!</p> <p>ჭრილობაში სპირტიანი ან ნებისმიერი სხვა ხსნარის ჩასხმა</p>	
---	---	---	---

3.6. გულმკერდის შემავალი ჭრილობები როგორ დაედოს ჭრილობას სახვევი

1	დაეჭიროს	2	დაედოს
	<p>ხელისგული ჭრილობას ისე, რომ არ შეაღწიოს ჰაერმა</p>		<p>ჰერმეტული სახვევი ან ლეიკოპლასტირი</p>
			
	<p>დაუშვებელია!</p> <p>შემთხვევის ადგილზე უცხო საგნების ჭრილობიდან ამოღება</p>		<p>ტრანსპორტირება</p> <p>შეიძლება მხოლოდ „მჯდომარე“ მდგომარეობაში</p>

3.7. მუცლის ღრუში შემავალი ჭრილობები როგორ უნდა დაედოს ჭრილობებს სახვევი

1	დაიფაროს ჭრილობა სუფთა საფერით	3	აეწიოს ფეხები და გაეხსნას წელზე ქამარი. შეძლებისდაგვარად მუცელზე დაედოს ცივი
			
2	დამაგრდეს ლეიკოპლასტირით საფერი, რომელიც მთლიანად ფარავს ჭრილობის კიდეებს.		დახმარების მოლოდინში და ტრანსპორტირებისას დაზარალებული უნდა იყოს მხოლოდ „ზურგზე მწოლიარე” მდგომარეობაში, აწეული და მუხლებში მოხრილი ფეხებით
			აკრძალულია! <ul style="list-style-type: none"> • გამოვარდნილი ორგანოების გასწორება; • წყლის მიცემა.

**3.8. თერმული დამწვრობა როგორ უნდა დამუშავდეს დამწვრობები შემთხვევის
ადგილზე**

დამწვრობის დამუშავების წესი, დამწვრობისაგან გაჩერილი ბუშტების დაუზიანებლად	დამწვრობის დამუშავების წესი, კანისა და დამწვრობისაგან გაჩერილი ბუშტების მთლიანობის დაზიანებით
გაჩერდეს ცივი წყლის ჭავლის ქვეშ 10-15 წუთის განმავლობაში	და/ან

დაედოს ცივი 20-30 წუთის განმავლობაში	1	დაეფაროს მშრალი სუფთა ქსოვილი	2	მშრალი ქსოვილის ზემოდან დაედოს ცივი
--	---	--	---	--



არ შეიძლება!



დამწვარ ზედაპირზე ზეთებისა და ცხიმების
წასმა


აკრძალულია!

- წყლით გაბანა
- დამწვარი ზედაპირის
გადახვევა



3.9. თვალების ტრავმა

თვალის ან ქუთუთოს ჭრილობა		თვალების ან ქუთუთოების დამწვრობა მწვავე ქიმიური ნივთიერებებით	
1	დაიფაროს თვალი სუფთა საფენით	1	ფრთხილად გაეწიოს ქუთუთოები და გაჩერდეს ცივი წყლის ჭავლის ქვეშ
	 		 
	დაზარალებულს ყველა ოპერაცია ჩაუტარდეს „მწოლიარე“ მდგომარეობაში.		
2	დაფიქსირდეს საფენი სახვევით და აუცილებლად დაიფაროს იგივე საფენით მეორე თვალიც გუგების მოძრაობის შესაჩერებლად	2	გაიბანოს თვალი ისე, რომ წყლის ჭავლი მიემართებოდეს ცხვირიდან გარე მიმართულებით



არ შეიძლება!

ნაჩხვლეტი ან გაჭრილი თვალისა და
ქუთუთოების ჩამობანა

დაუშვებელია!

გამანეიტრალებელი სითხეების გამოყენება
თვალში მძაფრი ან მწვავე ნივთიერებების
მოხვედრისას (მჟავა, ტუტე)

3.10. კიდურების მვლების მოტეხილობა რა უნდა გაკეთდეს კიდურების მვლების
მოტეხილობის დროს

დაფიქსირდეს


კიდურები ასაწყობი არტაშანით



წინა მხრის
მვლისა და
იდაყვის
სახსრის

დაფიქსირება


წვივის
მვლების,
მუხლისა და
წვივ-ტერფის
სახსრების
დაფიქსირება



დაფიქსირდეს

კიდური ხელთ არსებული საშუალებებით

შეიძლება გადაეხვეს წებისმიერი თანმიმდევრობით



აუცილებელია ფეხებს შორის ნაჭრის ჩალიჩის
ამოდება

წვივის, მენჯ-ზარძაყის მვლებისა და მუხლის
სახსრის დაფიქსირება





ასეფერო მიხევე ტანის
ცხლისას და მუხლის
სახსრის მიხედვისას

„ბაყაყისებრი“ მდგომარეობა, მუხლებქვეშ
ამოედოს მისივე ტანსაცმლისაგან
დამზადებული ჩალიჩი



არ შეიძლება!

არტაშანის გამოყენება თუ დაზარალებული წევს
„ბაყაყისებრ“ მდგომარეობაში

3.11. დაზარალებულის გადაყვანის წესი „ნიდერლანდური ხიდის” მეთოდით

	<p>პირველ მაშველი - უჭირავს დაზარალებულის თავი და მხრები მეორე მაშველი - დაზარალებულს აუწევს წელს, უჭირს ხელებს, აკონტროლებს სხვა მაშველთა მოქმედებას და იძლევა ბრძანებას „ერთი-ორი! ავწიეთ!” მესამე მაშველი - იჭირს დაზარალებულის ტერფებს და წვივებს</p>
<p>ამგვარი ქმედებით დაზარალებულის გადაყვანა შეიძლება „მუცელზე მწოლიარე” მდგომარეობაშიც</p>	<p>საერთო ამოცანა – შენარჩუნდეს დაზარალებულის სხეულის ჰორიზონტალური მდგომარეობა</p>
	<ul style="list-style-type: none"> კიბეზე ზემოთ, სანიტარულ ტრანსპორტი შეყვანის დროს – თავით წინ; კიბეზე ქვემოთ, სანიტარული ტრანსპორტიდან გამოყვანისას – ფეხებით წინ; წინ მიმავალნი ყურადღებით იყურებიან ფეხქვეშ, აკონტროლებენ მოძრაობას და აფრთხილებენ უკანმავალთ ყველა დაბრკოლების შესახებ; უკანმავალი თვალყურს ადევნებს დაზარალებულის მდგომარეობას და აუცილებლობის შემთხვევაში გასცემს ბრძანებას „სდექ! დაეწყო ღებინება!” ან „სდექ! დაკარგა გონება!“.

3.12. პირველადი დახმარება ელექტროდენით დაშავებისას

<p>ელექტრული დენის ზემოქმედებისაგან განთავისუფლების წესები</p> 		
--	--	---

1000 ვ-ზე მაღალი მაბვის შემთხვევაში საჭიროა:

დიელექტრიკული ხელთათმანის, რეზინის ბოტების ან კალოშების ჩაცმა;
იზოლირებელი შტანგის ან მაიზოლირებელი მარწუხის აღება;
6-20 კვ საპარო ელექტროგადამცემი ხაზის გამტარების გადამოკლება, სპეციალური ინსტრუქციის შესაბამისად;
მაიზოლირებელი შტანგით მოცილდეს დაზარალებულს სადენი;
გამოთრეულ იქნას დაზარალებული ტანსაცმელზე ხელის ჩავლებით გამტარის მიწასთან შეხების ადგილიდან ან მაბვის ქვეშ მყოფი დანადგარიდან 10 მ-ის მოშორებით


არ შეიძლება!

პირველადი დახმარების გაწევა, სანამ დაზარალებული არ განთავისუფლდება ელექტროდენის ზემოქმედებისაგან

მთავარი ამოცანა

დაზარალებულის სიმაღლიდან რაც შეიძლება სწრაფად დაშვება, იმისათვის, რომ სასწრაფოდ ჩატარდეს პირველადი დახმარება უფრო მეტად მოხერხებულ და უსაფრთხო პირობებში (მიწაზე, მოედანზე)

,„ბიჯური” მაბვის ზონაში გადაადგილების წესები



ელექტრული გამტარის მიწასთან შეხების წერტილიდან 10 მ-ის რადიუსში შეიძლება „ბიჯური” მაბვის ზონაში მოხვედრა.

„ბიჯური” მაბვის ზონაში გადაადგილება უნდა ხდებოდეს დიელექტრიკული ბოტებით ან კალოშებით ან/და „ბატის ნაბიჯით” გადადგმული ფეხის ტერფი არ უნდა ასცდეს მიწას და ქუსლი წინიდან (გახოხებით) უნდა მიედგას მეორე ფეხის წვერს.


არ შეიძლება!

ფეხსაცმლის ლანჩების მოშორება მიწის ზედაპირიდან, აგრეთვე გრძელი ნაბიჯების გადადგმა

არ შეიძლება!

ჩამოვარდნილ სადენთან სირბილით მიახლოება

თუ დაზარდებული არ არის გრძნობასე და
არ მცირდება კულსი საპილი არტიკულასე



განთავისუფლეთ დაზარალებული დენის
ზემოქმედებისაგან (არ დაივიწყო საკუთარი
უსაფრთხოება!)

საძილე არტერიაზე პულსის არქონის შემთხვევაში
განაპორციელეთ მუშტის დარტყმა გულმკერდის
არეში და დაიწყეთ რეანიმაცია.

კომის შემთხვევაში – გადაბრუნეთ მუცელზე.

ელექტრო დამწვრობის და ჭრილობების
შემთხვევაში–დაადეთ სახვევი.

კიდურების მვლების მოტებილობის შემთხვევაში
– არტაშანი.

გამოიძახეთ „სასწრაფო დახმარება“




დაუშვებელია!

- დაზარალებულზე შეხება, ძაბვის
ზემოქმედებისაგან მისი წინასწარი
განთავისუფლების გარეშე.
- რეანიმაციული ღონისძიებების შეწყვეტა
ბიოლოგიური სიკვდილის ნიშნების
გამოვლენამდე

3.13. სიმაღლიდან ჩამოვარდნა რა უნდა გაკეთდეს სიმაღლიდან ჩამოვარდნის შემთხვევაში, როცა დაზარალებული გონზეა

1	შეფასდეს დაზარალებულის მდგომარეობა	
იძულებით „ბაყაყისებრი“ მდგომარეობა _ არის მძიმე და საშიში დაზიანებების უტყუარი ნიშანი		
დაზარალებულს არ შეუძლია	ტერჯები გადაწეული აქეთ-იქეთ,	

<p>ვეხების მდებარეობის შეცვლა</p>	<p>მუხლები წამოწეული და ერთმანეთს დაცილებული.</p>
<p>ასეთ დაზიანებებს განეკუთვნება:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - მენჯის მვლის მოტეხილობა და მენჯ-ბარძაყის სახსრების დაზიანება; - თეძოს ძვლის მოტეხილობა; - ხერხემლის დაზიანება; - შინაგანი ორგანოების დაზიანებები და შინაგანი სისხლდენა. 	
<p>არ შეიძლება!</p> <p>დაზარალებულის გადაყვანა ტანსაცმლის გახდა ან განძრევა</p>	

2	<p>გადააწვინეთ დაზარალებული ციცხვისებრ საკაცებზე</p>  
გავხსნათ და გავშალოთ საკაცის ციცხვი	ფრთხილად შევაერთოთ საკაცის ციცხვი დაზარალებულის სხეულის ქვეშ
3	<p>გადააწვინეთ დაზარალებული ვაკუუმურ ლეიიზზე</p>  <p>გამოიყენება:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ბარძაყისა და წვივის ძვლის მოტეხილობისას; - ხელხემლის დაზიანებისას; - მენჯისა და მენჯ-ბარძაყის სახსრების დაზიანებისას.
დაუშვით დაზარალებული ვაკუუმურ ლეიიზზე, ფრთხილად გააცალკევეთ საკაცის	დაუშვებელია!

ციცხვი და გამოაცალეთ ისინი
დაზარალებულს ქვემოდან

მეტალის საკაცეზე მწოლიარე დაზარალებულის
დატოვება 10-15 წთ-ზე მეტი დროის განმავლობაში

4

დაფიქსირდეს

დაზარალებული ვაკუუმურ ლეიიზზე „ბაყაყისებურ“ მდგომარეობაში




პირველი მაშველი - აფიქსირებს ხერხემლის კისრის არეს

მეორე მაშველი - ფრთხილად წევს ლეიიზს
დაზარალებულის მუხლებთან

მესამე მაშველი - თავისუფალი ფეხით აკეთებს
ჩალიჩს დაზარალებულის ტერფების მისაბჯენად
და გამოტუმბავს ლეიიზიდან ჰაერს

3.14. ავტოსაგზაო შემთხვევები მოქმედების სქემა ავტოსაგზაო შემთხვევისას თუ
დაზარალებულს არ აქვს სიცოცხლის ნიშნები



თუ დაზარალებული იმყოფება უგონოდ


დარწმუნდით სამილე არტერიაზე პულსის არსებობაში სწრაფად დააწვინეთ დაზარალებული მუცელზე

- გაუწიმინდეთ პირის ღრუ ცხვირსახოცის ან ხელსახოცის საშუალებით
- სისხლდენისას – დაადეთ სისხლის შემაჩერებელი ლახტი
- ჭრილობაზე – დაადეთ სხვევი
- ძვლებისა და კიდურების მოტეხილობაზე ეჭვის გაჩენისას დაადეთ – არტაშანი
- გამოიძახეთ „სასწრაფო დახმარება“

დაუშვებელია!

- კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი დაზარალებული დავტოვოთ ზურგზე მწოლიარე;
- თავქვეშ ბალიშის, ჩანთის და გადახვეული ტანსაცმლის ამოდება;
- დაზარალებულის გადაყვანა ან გადათრევა უკიდურესი აუცილებლობის გარეშე (აფეთქების საშიშროება, ხანძარი და ა.შ.)

3.15. წყალში ჩაძირვა მოქმედების სქემა წყალში ჩაძირვის შემთხვევაში



• ჩაძირულის წყლიდან ამოყვანისთანავე – გადააბრუნეთ პირქვე და დაუწიეთ თავი	• თუ არ აღინიშნება პირდებინების მომრაობები და პულსი – დააწვინეთ ზურგზე და
--	---

<p>მეწუზე დაბლა</p> <ul style="list-style-type: none"> • გაანთავისუფლეთ პირი უცხო სხეულებისაგან და ლორწისაგან. მყისიერად დაწექით ენის ძირზე. • ღებინებისა და ხველების რეფლექსების გამოვლენისთანავე — მიაღწიეთ მუცლიდან, ფილტვებიდან და სასუნთქი 	<p>დაიწყეთ რეანიმაცია.</p> <ul style="list-style-type: none"> • სასიცოცხლო ნიშნების გამოვლენისას — გადააბრუნეთ პირქვე, გამოდევნეთ წყალი ფილტვებიდან და მუცლიდან. • გამოიძახეთ სასწრაფო დახმარება
<p>დაუშვებელია!</p> <ul style="list-style-type: none"> • დაზარალებულის უმეთვალყურეოდ დატოვება (წებისმიერ მომენტში შეიძლება გაჩერდეს გული) • დაზარალებულის საკუთარი ძალებით გადაყვანა, თუ არის სამაშველო სამსახურის გამოძახების შესაძლებლობა 	

მოქმედების სქემა ცივ წყალში და ყინულჭრილში ჩაძირვისას




<p>გადაიყვანეთ დაზარალებული უსაფრთხო ადგილზე</p> <ul style="list-style-type: none"> • შეამოწმე გუგების რეაქცია შუქზე და საძილე არტერიაზე პულსის არსებობა • მოქმედების სქემა ცივ წყალში და ყინულჭრილში ჩაძირვისას • საძილე არტერიაზე პულსის არ არსებობისას — შეუდექით რეანიმაციას • თუ გამოვლინდა სიცოცხლის ნიშნები — გადაიყვანეთ გადარჩენილი თბილ სათავსოში, გადააცვით მშრალი ტანსაცმელი, მიეცით თბილი სასმელი • გამოიძახეთ „სასწრაფო დახმარება“ • დაუშვებელია! • დროის დავარგვა მუცლის ღრუდან და ფილტვებიდან წყლის გამოდევნაზე, როცა საძილე არტერიაზე პულსი არ ისინჯება 	<ul style="list-style-type: none"> • საკუთარ თავს დაეხმარე თავად — თუ ჩავარდი ყინულიან წყალში • არ დაიბრნე! ყინულზე ამოდი მხოლოდ იმ მხრიდან, საიდანაც ჩავარდი • შეეცადე სხეულის ზედა ნაწილით მთლიანად დაეყრდნო ყინულის რაც შეიძლება მყარ და დიდ ნაწილს • გახოხდი პირველი 3-4 მეტრი აუცილებლად საკუთარ ნაკვალევზე
--	--

3.16. გადაციება და მოყინვა

<p>მოქმედების სქემა სხეულის გადაცივებისას</p> <ul style="list-style-type: none"> • კუნთების კანკალისა და ციების დროს საჭიროა დამატებით დააფაროთ და მისცეთ თბილი და ტკბილი სასმელი ან საკვები შაქრის დიდი შემცველობით. • მიეცეს (თუ ამის შესაძლებლობაა) 50 მლ ალკოჰოლი და 1 სთ-ის განმავლობაში გადაიყვანეთ თბილ სათავსოში • თბილ სათავსოში — სასწრაფო 	<p>მოქმედების სქემა სხეულის მოყინვისას</p> <p>რაც შეიძლება სწრაფად გადაიყვანეთ თბილ სათავსოში, მოყინული კიდურები გაანთავისუფლეთ ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლისაგან.</p> <p>სასწრაფოდ დაადეთ დაზიანებულ კიდურებს თერმოსაიზოლაციო სახვევი გარე სითბოსაგან</p>
--	---

<p>გახადეთ ტანსაცმელი და ჩააწვინეთ აბაზანაში 35_40 გრადუსი წყლის ტემპერატურით ან შემოუწყეთ დიდი რაოდენობით სათბუნებელი</p> <ul style="list-style-type: none"> • გამათბობელი აბაზანის შემდეგ აუცილებლად დააფარეთ ან ჩააცვით მშრალი და თბილი ტანსაცმელი • გააგრძელეთ თბილი და ტკბილი სასმელების მიცემა ექიმის მოსვლამდე დაუშვებელია! • ალკოჰოლის განმეორებითი დოზების მიცემა ან იმ შემთხვევაში შეთავაზება როცა დაზარალებული მთვრალია • გასათბობი აბაზანისთვის 30 გრადუსზე ნაკლები ტემპერატურის წყლის გამოყენება 	<p>დაცვის მიზნით.</p> <p>მიეცეს დიდი რაოდენობით თბილი სითხე აუცილებლად მიეცეს ტკივილგამაყუჩებელი შეთავაზეთ ალკოჰოლის მცირე დოზა აუცილებლად გამოიძახეთ „სასწრაფო დახმარება“ დაუშვებელია!</p> <ul style="list-style-type: none"> - მოყინული კიდურის დაზელვა - დაზიანებული კიდურების თბილ წყალში მოთავსება და სათბუნებლების შემოწყობა - კანზე ზეთებისა და ვაზელინის წასშა
---	---

3.17. გულწასულობა მოქმედების სქემა გულწასულობის დროს

1		2	
დარწმუნდით საძილე არტერიაზე პულსის არსებობაში		გაანთავისუფლეთ გულმკერდი ტანსაცმლისაგან და გაუხსენით წელზე ქამარი	
3		4	
აუწიეთ ფეხები		დააწექით მტკიცნეულ წერტილზე	
თუ საძილე არტერიაზე პულსი არ ისინჯება - - შეუდექით რეანიმაციის კომპლექსის ჩატარებას		თუ საძილე არტერიაზე პულსი ისინჯება — აუწიეთ ფეხები, შეუხსენით საკინძე და წელზე ქამარი	
დააჭირეთ მტკიცნეულ წერტილს		თუ 3 წუთის განმავლობაში გონზე არ მოვიდა — დააწვინეთ მუცელზე და თავზე დაადეთ ცივს	

მუცელში ტკივილის შეგრძნებისას ან განმეორებითი გულის წასვლისას — ცივი დაადეთ მუცელზე	თბური და მზის დაკვრის დროს — გადაიყვანეთ გრილ ადგილზე, დაადეთ ცივი თავსა და მკერდზე
შიმშილით გულწასულობისას — დაალევინეთ ტკბილი ჩაი	გულის წასვლის ყველა შემთხვევაში ექიმის გამომახება აუცილებელია
დაუშვებელია!	
<p>-- მათბუნებლების დადება მუცელსა და წელზე მუცლის ტკივილისას და გულის წასვლის განმეორების შემთხვევაში;</p> <p>-- საკვების მიცემა შიმშილისაგან გულწასულობის შემთხვევაში.</p>	
3.18. კიდურების მიჭყლეტვა	3.19. გველის და მწერების ნაკბენი
მოქმედების სქემა კიდურების ხანგრძლივი ჭყლეტის დროს	მოქმედების სქემა გველების და შხამიანი მწერების დაკბენის შემთხვევაში
შემოუწყეთ მიჭყლეტილ კიდურებს ყინულის, თოვლის ან ცივი წყლის პაკეტები	მოაცილეთ წესტარი ნაკბენიდან
მიეცით ტკივილგამაყუჩებელი, შესთავაზეთ თბილი სასმელი დიდი რაოდენობით	ნაკბენზე დაადეთ ცივი. (გველგესლას ნაკბენზე დაადეთ ბაყაყი მუცლით ან სპეციალური სახვევი „კოლეტექსი“)
დაადეთ დამცავი ლაბტი მიჭყლეტილ კიდურებზე მათ განთავისუფლებამდე	ჩაწვეთეთ 5-6- წვეთი გალაზოლინი ან სანორინი ცხვირში და ნაკბენში
კიდურები, განთავისუფლების თანავე მჭიდროდ გადაახვიეთ	კიდურებზე კბენისას — აუცილებლად დაადეთ არტაშანი
დაადეთ არტაშანები	მიეცით ბევრი და სასურველია ტკბილი სითხე
განმეორებით დაადეთ ცივი დაზიანებულ ზედაპირზე	თვალყური ადევნეთ დაზარალებულის მდგომარეობას ექიმის მოსვლამდე
ექიმების მოსვლამდე გააგრძელეთ დიდი რაოდენობით თბილი სასმელის მიცემა	გონების დაკარგვის შემთხვევაში — დააწვინეთ მუცელზე. გულის შეჩერებისა და სუნთქვის შეწყვეტისას — დაიწყეთ რეანიმაცია
დაუშვებელია!	
<ul style="list-style-type: none"> - დამცავი ლაბტის დადებამდე და დაზარალებულისათვის დიდი რაოდენობით სითხის მიცემამდე მიჭყლეტილი კიდურების განთავისუფლება - მიჭყლეტილი კიდურების შეთბობა 	
დაუშვებელია!	
<ul style="list-style-type: none"> - გულის წასვლის შემთხვევაში დაზარალებულის დატოვება გულაღმა მწოლიარე მდგომარეობაში. - მათბუნებლის ან გამათბობელი კომპრესის გამოყენება 	

3.20. ქიმიური დამწვრობები და გაზებით მოწამვლა

მოქმედების სქემა ქიმიური დამწვრობის შემთხვევაში	მოქმედების სქემა შხამიანი გაზებით მოწამვლის შემთხვევაში
<p>ნებისმიერი აგრესიული ხსნარით დაზიანებისას (მჟავით, ტუტით, გამხსნელით, სპეცსაწვავით, ცხიმებით და ა.შ.) — გაიბანოს ცივი წყლის ჭავლით სასწრაფოს მოსვლამდე</p>	<ul style="list-style-type: none"> • გაიყვანეთ სუფთა ჰერზე • გონის დაკარგვისა და საძილე არტერიაზე პულსის არ არსებობის შემთხვევაში შეუდევებით რეანიმაციის კომპლექსს • 4 წთ-ზე მეტი დროით გულწასულობის შემთხვევაში დააწვინეთ მუცელზე და დაადეთ ცივი თავზე • ყველა შემთხვევაში გამოიძახეთ სასწრაფო დახმარება

3.21. ძირითადი მანიპულაციების ჩატარებისათვის საჭირო ნიშნები

<p>როდის არის საჭირო დაუყოვნებლივ განხორციელდეს გულმკერდზე მუშტის დარტყმა და გულისა და ფილტვების რეანიმაციის დაწყება</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. დაზარალებული არის უგონოდ 2. თვალის გუგები არ რეაგირებენ სინათლეზე 3. არა აქვს პულსი საძილე არტერიაზე <p>დაუშვებელია!</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. დროის დაკარგვა მომხდარის გამომწვევი მიზეზების დადგენაზე 2. პანიკაში ჩავარდნა 3. დროის დაკარგვა სუნთქვის ნიშნების დადგენაზე <p>როდის არის აუცილებელი კიდურებზე არტაშანის დადება</p>	<p>როდის უნდა დაედოს მიმჭერი</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. სახვევი სისხლდენისას, როდესაც სისხლი პასიურად ჩამოედინება ჭრილობიდა 2. კიდურების განთავისუფლებისთანავე მიჰყლებივის სინდრომის დროს <p>როდის არის საჭირო სისხლშემაჩერებელი ლახტის სასწრაფოდ დადება</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ჭრილობიდან ალისფერი სისხლი გამოედინება შადრევანივით 2. ჭრილობაზე წარმოიქმნება გამონადენი სისხლის ბურთულა 3. დიდი სისხლის ლაქა დაზარალებულის ტანსაცმელზე ან სისხლის გუბე მის სიახლოვეს <p>როდის გადაპყავთ დაზარალებული ფიცარზე მწოლიარე მუხლებქვეშ ამოდებული ჩალიჩით ან</p>
---	---

1. ჩანს ძვლის ნამსხვევები	ვაკუუმური საკაცით „ბაყაყისებრ” მდგომარეობაში”
2. ჩივილი ტკივილზე	1. როცა არსებობს ეჭვი მენჯის ძვლის მოტეხილობაზე
3. კიდურების დეფორმირებისა და შემსუპების შემთხვევაში	2. როდესაც ეჭვი არსებობს ბარძაყის ძვლის ზედა მესამედის მოტეხილობაზე და მენჯ-ბარძაყის სახსრის დაზიანებაზე
4. მიჭილეტილი კიდურების განთავისუფლებისას	როდესაც არსებობს ეჭვი ხერხემლისა და ზურგის ტვინის დაზიანებაზე
5. შხამიანი გველების კბენის დროს	
როდის არის აუცილებელის დამცავი ლახტების დადება	როდის გადაყავთ დაზარალებული მხოლოდ პირქვე (მუცელზე მწოლიარე) კომის მდგომარეობაში
მიჭილეტვის სინდრომის შემთხვევაში კიდურების განთავისუფლებამდე	1. ხშირი ღებინებისას 2. ზურგის დამწვრობის შემთხვევაში 3. როცა ვეჭვობთ ზურგის ტვინის დაზიანებას, როდესაც ხელთ გვაქვს ბრეზენტის საკაცე
როდის შეიძლება დაზარალებულის გადაყვანა მხოლოდ ზურგზე მწოლიარე აწეული ან მუხლებში მოხრილი ფეხებით.	როდის გადაჰყავთ დაზარალებული მჯდომარე ან ნახევრად მჯდომარე მდგომარეობაში
1. მუცლის ღრუს გამჭოლი ჭრილობის დროს 2. სისხლის დიდი დანაკარგის დროს ან როცა არსებობს ეჭვი შინაგან სისლდენაზე	1. გულმკერდის შემავალი ჭრილობის დროს 2. კისრის ჭრილობის დროს

3.22. საშიში დაზიანებებისა და მდგომარეობის ნიშნები

უეცარი სიკვდილის ნიშნები (როდესაც ყოველი წამი შეიძლება გახდეს დამღუპველი)	კომის ნიშნები 1. გონების დაკარგვა 4 წთ-ზე მეტ ხანს 2. აუცილებლად ისინჯება პულსი საძილე არტერიაზე
1. უგონოდ ყოფნა 2. როცა არ არის გუგების რეაქცია სინათლეზე 3. როდესაც საძილე არტერიაზე არ ისინჯება პულსი	არტერიული სისხლდენის ნიშნები 1. ალისფერი სისხლი გამოდის ჭრილობიდან შადრევანივით


<p>2. გუგის დეფორმაცია თვალზე თითის ფრთხილად დაჭირისას.</p> <p>3. გვამური ლაქების გაჩენა</p>	<p>2. ჭრილობაზე ჩნდება გამოსული სისხლის ბურთულა</p> <p>3. დიდი სისხლის ლაქა ტანსაცმელზე ან სისხლის გუბე დაზარალებულთან ახლოს</p>
<p>წყალში დახრჩობის ნიშნები</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. სახისა და კისრის კანის სილურჯე 2. სისხმარღვების შესიება კისრის არეში 3. პირიდან და ცხვირიდან დიდი რაოდენობით ქაფის გამოყოფა 	<p>ვენური სისხლდენის ნიშნები</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. სისხლი პასიურად ჩამოედინება ჭრილობიდან 2. სისხლს აქვს ძალიან მუქი ფერი
<p>მკრთალი დახრჩობის ნიშნები</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. კანის ღია ნაცრისფერი ფერი გაგანიერებული გუბა, რომელიც არ რეაგირებს სინათლეზე 2. საძილე არტერიაზე პულსის არ არსებობა 3. პირის კიდეებზე ხშირ შემთხვევაში მშრალი, ცხვირსახოცით ადვილად მოსაცილებელი ქაფი 	<p>გულწასვლის ნიშნები</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. მცირე ხნით გრძნობის დაკარგვა (არაუმეტეს 3-4 წუთისა) 2. გრძნიბის დაკარგვას წინ უსსწრებს: უეცარი სისუსტე, თავბრუს ხვევა, ყურებში შუილი და თვალებში დაბნელება
<p>გადაციების ნიშნები</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. შეციება და კანკალი 2. ცნობიერების დარღვევა: <ol style="list-style-type: none"> a. შენელებულობა და აპათია b. ბოდვა და ჰალუცინაციები c. არაადექვატური ქმედება 3. ტუჩების გალურჯება ან გაფერმკრთალება 4. სხეულის ტემპერატურის დაცემა 	<p>ქვედა კიდურების დაჭილებულის ნიშნები (აღინიშნება 15 წთ-ის შემდეგ დაჭილებილი კიდურის)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. განთავისუფლების შემდეგ — მდგომარეობის უეცარი გაუარესება კიდურებზე შეშუპოების წარმოქმნა 2. კუნთების რელიეფის გაქრობით 3. პულსის არ არსებობა ტერფებთან წითელი ან ვარდისფერი შარდი
<p>ქვედა კიდურების დაჭილებულის ნიშნები (აღინიშნება 15 წთ-ის შემდეგ დაჭილებილი კიდურის)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. განთავისუფლების შემდეგ — მდგომარეობის უეცარი გაუარესება კიდურებზე შეშუპოების წარმოქმნა 2. კუნთების რელიეფის გაქრობით 3. პულსის არ არსებობა ტერფებთან 	<p>ქვედა კიდურების გაყინვის ნიშნები</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. მგრძნობიარობის დაკარგვა 2. ფერმკთალი, მაგარი და ცივი კანი 3. მაჯაზე პულსის არ არსებობა 4. თითით დაკაკუნებისას „ხის“ ხმა

წითელი ან ვარდისფერი შარდი	
ქვედა კიდურების გაყინვის ნიშნები	
1.	მგრძნობიარობის დაკარგვა
2.	ფერმკთალი, მაგარი და ცივი კანი
3.	მაჯაზე პულსის არ არსებობა
4.	თითით დაკაუნებისას __ „ხის“ ხმა

Approval Of The Order No.

Approved by:

გენერალური დირექტორის მოადგილე:
Deputy General Director:




22.08.19

ჰიდროელექტროსადგურების ექსპლუატაციის,
დიაგნოსტიკის და ტექნიკური დეპარტამენტის
უფროსი:


Head of Department Exploitation, Diagnostic, And
Maintenance of Hydroelectric Power plants:

22.08.2019



მრომის უსაფრთხოების მენეჯერი:
Labor Safety Manager:


22.08.19



ანალიზის, რისკების შეფასების, ნორმატიული
დოკუმენტაციის წარმოების განყოფილების
უფროსი:

Head of Analysis, Risk assessment, Normative
Documentations processing Division:

26.08.196



სხვა:
Other: